

ANTWOORD OP DE VRAAG OM UITLEG VAN 5-4844 VAN LIJNEN

1/ Op basis van de studie uitgevoerd door het netwerk van peilpraktijken, weten we dat 91% van de patiënten die Erythema Migrans vertonen onmiddellijk een behandeling met antibiotica ontvangen.

Table 3 Evolution of the management of asymptomatic tick bites and erythema migrans by SGP (2003–2004 and 2008–2009)

Time period	Asymptomatic tick bites			Erythema migrans		
	N	Antibiotics (%)	Serology (%)	N	Antibiotics (%)	Serology (%)
2003–2004	674	12	9	294	85	51
2008–2009	699	9	17.5	338	91	54
p-value		NS	0.004		0.009	NS

NS not significant

Deze studie zal worden herhaald in 2015.

2/Wat betreft de vraag over de behandeling, komt het vermelde schema overeen met dat wat door het ILADS (International Lyme And Associated Diseases Society) vooropgesteld wordt. ILADS pleit voor het langdurig en herhaaldelijke, vaak sequentiële gebruik van antibiotherapie (met verschillende moleculen), vaak vergezeld van dieetmaatregelen. Deze aanbevelingen gaan in tegen aanbevelingen geformuleerd door een Europese groep van deskundigen (EUCALB - European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis) die ook met die van de IDSA (International Lyme Associated Disease Society) overeenkomen.

Onze Belgische experts hebben deze verschillende aanbevelingen herzien en ze hebben verkozen om deze van EUCALB en IDSA te volgen. Dit advies verschijnt in de Sanford, alsook in de aanbevelingen van de Bapcoc (Belgische antibiotica beleid coördinatiecomité). Deze aanbevelingen worden op gezette tijden herzien om rekening te kunnen houden met nieuwe wetenschappelijke gegevens. Naast het 'evidence-based' karakter van de aanbevelingen van de IDSA, in een periode waar het buitensporige voorschrijven van antibiotica waarschijnlijk veel meer problematisch is dan ziekte van Lyme, lijken de diagnostische en therapeutische standpunten van de ILADS niet verdedigbaar voor onze experts. De mediatisering van deze pathologie mag volgens hen niet afwijken van de algemene regel.

Overeenkomstig de Belgische aanbevelingen, varieert de aanbevolen duur van de behandeling met antibiotica bij de diagnose van elke vorm van de ziekte van Lyme (erytheem chronicum migrans) tussen 10 en 21 dagen naargelang de voorgeschreven antibiotica.

3/ Zoals bij elke infectieziekte het geval is: als de patiënt geen klachten meer heeft na het nemen van de aanbevolen behandeling, het wordt beschouwd als genezen.

Als de patiënt aanhoudende klachten heeft, zal hij/zij opnieuw in behandeling gaan bij zijn arts om de diagnose van de aard van de ziekte vast te stellen en de maatregelen te nemen die nodig zijn.

4/ Zoals vermeld in het antwoord op vraag nummer 5-4843, bestaat er momenteel geen gegevens over de opvolging van patiënten die genezen zijn van een ziekte. Net zoals het geval was voor de vragen 4843, 3) en 4844, 1) kan dit soort informatie worden verzameld binnen

het kader van een gespecialiseerde epidemiologische studie. In dit stadium, is de keuze van de behandeling gebaseerd op wetenschappelijke studies die hun doeltreffendheid aantonen.

Laurette Onkelinx