

ANTWOORD OP VRAAG OM UITLEG 5-3371 VAN N.LIJNEN

Voor bepaalde aandoeningen stijgt het geneesmiddelengebruik door een stijgende prevalentie van de aandoening, wat het geval is bij luchtwegaandoeningen. De oorzaken van deze aandoeningen zijn vaak te wijten aan de luchtvervuiling.

Eenmaal de diagnose gesteld is, is het de verantwoordelijkheid van de behandelende arts om een geschikt geneesmiddel voor te schrijven.

Uiteraard dient opgelet te worden voor overbehandeling, zoals het gebruik van inhalatiecorticosteroiden bij piepende ademhaling.

De Farmanetgegevens voor het afleveringsjaar 2012 zijn op dit moment nog niet volledig. Daarom is de berekening enkel gebaseerd op de Farmanetgegevens van de periode 2007-2011. In dat laatste jaar werden in de openbare officina apotheken in totaal bij kinderen van 0 tot en met 17 jaar, een kleine 27 miljoen (standaard)-dagdosissen afgeleverd van geneesmiddelen gebruikt bij astma. Een gedeelte van deze geneesmiddelen bevatten inhalatiecorticosteroiden, alleen of in combinatie met een ander middel (een luchtwegverwijder). Hiervan werden er in totaal 9,4 miljoen dagdosissen afgeleverd in 2011.

Kinderen kunnen net als volwassenen onderhevig zijn aan de bijwerkingen van geïnhaleerde corticosteroiden zoals orofaryngale schimmelinfecties, heesheid en keelpijn. Door resorptie via de long en/of vanuit de orofarynx kunnen systemische effecten optreden. Langdurig gebruik van hoge doseringen kan leiden tot systemische effecten zoals remming van de bijnierschorsfunctie, vermindering van de botdichtheid, cataract en glaucoom. Bij gebruik van inhalatiecorticosteroiden zijn psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen gezien, met name bij kinderen.

Voor het opstellen van specifieke therapeutische richtlijnen voor de luchtwegmiddelen in de pediatrie heb ik de vraag gesteld aan het Comité voor de evaluatie van de medisch praktijk inzake geneesmiddelen van het RIZIV om deze op een Consensusvergadering uit te werken in samenspraak met de deskundigen ter zake.

Wel kan ik al meegeven dat voor het rationeel gebruik van antibiotica BAPCOC eind deze maand de Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk naar alle artsen en pediaters zal opsturen waarin een hoofdstuk gewijd is aan acute infecties van de lage luchtwegen bij kinderen.

Ik heb beslist om binnenkort een nieuwe campagne op te starten met de bedoeling het luik over het goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen verder te ontwikkelen. Die wordt gelanceerd op 29 april. Dit onderwerp was namelijk één van de 12 kernpunten besproken in de campagne van het FAGG naar de bevolking van september 2011: "Een geneesmiddel is geen snoepje".

Deze nieuwe campagne zal in het bijzonder worden toegespitst op de behandeling bij kinderen van hoest en verkoudheid, koorts en regurgitatie om de ouders uit te leggen dat deze veel voorkomende symptomen niet per se door geneesmiddelen moeten worden bestreden. De campagne zal enkele adviezen geven om in deze gevallen geneesmiddelen wanneer en zoals het hoort te gebruiken. Ook zal er aandacht getrokken worden aan kinderen met luchtwegaandoeningen.